

البطاقة التنبيهية للمريض

برادكسا®
دابيجاتران إتيكسيلات

الرجاء حمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات

تأكد من استخدام أحدث نسخته.

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية الخاصة بمستحضرات بوهرينجر إنجلهايم الرجاء الإتصال بالشركة:

pv_local_egypt@boehringer-ingelheim.com

بريد الكتروني:

تليفون (علي مدار 24 ساعة): +9647811172000 / +2(012) 7066-7262



مايو ٢٠٢٠

عزيزي المريض:

لقد بدأ طبيبك علاجك بعقار برادكسا و من أجل إستعمال آمن للعقار الرجاء الأخذ في الإعتبار المعلومات الهامة الموجودة بالداخل.

بما ان هذه البطاقة التنبيهية للمريض تحتوي على معلومات هامة عن العلاج الخاص بك الرجاء حمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات لتبلغ مقدمي الرعاية الصحية عن تناولك لعقار برادكسا.



معلومات للمرضى عن عقار برادكسا

بخصوص علاجك:

- براداكسا يجعل دمك أقل لزوجة، وهذا يمنع خطر اصابتك بجلطات الدم الخطيرة
- إتبع تعليمات طبيبك عند تناول عقار برادكسا، لا تتخطي جرعة أو توقف تناول عقار البراداكسا بدون التحدث لطبيبك المعالج.
- أبلغ طبيبك المعالج عن كل الأدوية التي تتناولها حالياً.
- أبلغ طبيبك المعالج عن تناولك لعقار برادكسا قبل أي تدخل جراحي أو عملية جراحية.
- يمكن تناول عقار برادكسا مع الطعام أو بدونه. يجب بلع الكبسولة كاملة مع كوب من الماء. لا تقم بتكسير الحبيبات أو مضغها أو تفريغ الحبيبات من الكبسولة.

متي تحتاج المشورة الطبية

- تناول عقار برادكسا قد يزيد خطورة النزيف. أبلغ طبيبك المعالج فوراً في حالة إصابتك بأحد أعراض وعلامات النزيف: تورم، عدم الراحة، ألم غير معتاد أو صداع، دوخة، شحوب، تعب، كدمة غير اعتيادية، نزيف من الأنف، نزيف اللثة، نزيف جروح مطول غير اعتيادي، تدفق حيض غير طبيعي أو نزيف مهلي، وجود دم في البول (بول وردي أو بني)، تغير لون البراز للأسود أو الأحمر، السعال الدموي، تقيؤ دم أو قيء بلون القهوة.
- اذا سقطت أو أصبت (خاصة إذا أصيبت رأسك) فيرجى طلب العناية الطبيه العاجله.
- لا توقف تناول عقار برادكسا دون التحدث إلى طبيبك، اذا كنت تعاني من حرقه المعدة، أو الغثيان، أو القيء، أو ألم المعدة، أو الانتفاخ، أو ألم البطن العلوي.

معلومات للمختصين بالصحة عن عقار برادكسا

- برادكسا مضاد للتخثر عن طريق الفم (مثبط مباشر للثرومبين).
- قد يلزم وقف عقار برادكسا قبل إجراء العمليات الجراحية أو غيرها من التدخلات الجراحية.
- في حالة حدوث نزيف شديد يجب وقف عقار برادكسا فوراً.
- يتم إخراج عقار برادكسا بشكل أساسي عن طريق الكلى، فيجب الحفاظ على إدرار البول الكافي. برادكسا قابل للإخراج عن طريق الغسيل الكلوي.

برجاء ملئ هذا الجزء أو إطلب من طبيبك ذلك

اسم المريض:

تاريخ الميلاد:

دواعي الإستعمال:

جرعة برادكسا: